

Ascitespunctie onder echogeleidinge



Ommelander Ziekenhuis
Groningen

Ascitespunctie onder echogeleide

Bij een ascitespunctie wordt buikvocht (ascites) verkregen met behulp van een holle naald. Dit gebeurt onder echogeleide. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

Wie voert de ascitespunctie uit?

De ascitespunctie wordt uitgevoerd door een radioloog, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door een MBB-er (radiodiagnostisch laborant).

Uw voorbereiding op de ascitespunctie

Voor de ascitespunctie is geen voorbereiding nodig.

De ascitespunctie

Op de afgesproken dag en tijd kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte.

Een MBB-er haalt u op en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. In deze kleedkamer wordt u gevraagd uw kleding uit te doen.

In de onderzoekkamer neemt u plaats op de onderzoektafel. Er wordt een warme gel op uw buik aangebracht. Vervolgens brengt de radioloog met het echoapparaat het gebied in beeld waaruit de punctie moet worden genomen. Hierna wordt de huid gedesinfecteerd.

Er wordt bij deze punctie geen verdoving gebruikt omdat het punteren van buikvocht een eenmalige kleine prik is, die over het algemeen niet als heel pijnlijk wordt ervaren.

Vervolgens prikt de radioloog een dunne naald in de buikholte en zuigt het buikvocht met een spuit op. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Het weggenomen buikvocht wordt in het laboratorium onderzocht.

Zijn er risico's aan de ascitespunctie verbonden?

Een ascitespunctie is in principe een veilige ingreep. Slechts in zeldzame gevallen ontstaat na deze ingreep een bloeding.

Opname in het ziekenhuis kan dan nodig zijn om deze complicatie goed te behandelen.

Na de ascitespunctie

Na het onderzoek krijgt u een pleister op de prikplaats. Daarna kunt u zich aankleden en naar huis gaan. Het is verstandig om na het onderzoek een uurtje rustig aan te doen.

Een ascitespunctie heeft geen invloed op de rijvaardigheid. Het is echter raadzaam om niet zelf te rijden, omdat u zich vanwege het onderzoek mogelijk niet zo fit voelt als u gewend bent.

Er kan een blauwe plek ontstaan op de plaats waar de huid is aangeprikt. Dit kan pijnlijk zijn, maar het kan verder geen kwaad en verdwijnt vanzelf. In geval van pijn kunt u zo nodig een paracetamol (geen aspirine!) nemen.

Stagiaires

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire de radioloog assisteert, laat u ons dat dan gerust weten.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van de ascitespunctie krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Bijzonderheden

- Bij verhindering verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.
- Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.
- Heeft u een telefonische afspraak gemaakt, vergeet u dan niet het aanvraagformulier mee te nemen! Zonder dit formulier wordt het onderzoek niet uitgevoerd.
- Eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.



**Samen.
De beste zorg.
Dichtbij.**

ommelanderziekenhuis.nl

T 088 - 066 1000

OZG (12-18)RAD 447