

Bronchiale provocatietest



Ommelander Ziekenhuis
Groningen

Uw behandelend arts verwijst u naar de functieafdeling voor een bronchiale provocatietest. Met dit onderzoek zoeken we naar de oorzaak van uw (long)klachten.

Wat is het doel van een bronchiale provocatietest?

Bij een provocatietest zoeken we de oorzaak van uw benauwdheidsklachten en/of hoestklachten.

Met behulp van deze test meten we de overgevoeligheid van uw luchtwegen.

Vorbereiding op het onderzoek

U mag gewoon eten en drinken.

Let op: drink vanaf 1 uur vóór het onderzoek geen koffie of thee meer. Rook dan ook niet meer.

Voor het onderzoek moet u bepaalde longmedicatie staken, in de tabellen die volgen kunt u zelf uw eigen medicatie opzoeken en kijken hoe lang voor het onderzoek u deze moet stoppen.

Indien u medicatie tegen allergie/hooikoorts (antihistaminica) gebruikt, op recept of vrij verkrijgbaar, dit 72 uur voor het onderzoek niet innemen.

12 uur van te voren staken:

Merknaam	Generieke naam
Airomir	Salbutamol
Atrovent	Ipratropium
Bricanyl	Terbutaline
Berodual	Fenoterol+ Ipratropium
Combivent	Salbutamol + Ipratropium
Ventolin	Salbutamol

48 uur van te voren staken

Merknaam	Generieke naam
AirFluSal Forspiro	Salmeterol + Fluticason
Aerivo	Salmeterol + Fluticason
Atimos	Formoterol
Bufoleer Easyhaler	Formoterol + Budesonide
Busalair	Salmeterol + Budesonide
Daxas	Roflumilast, Actieve metaboliet
Duaklir Genuair	Acclidinium + Formoterol
DuoResp Spiromax	Formoterol + Budesonide
Elpenhaler	Salmeterol + Fluticason
Eklira Genuair	Acclidinium
Flutiform	Formoterol + Fluticason
Foradil	Formoterol
Foster	Formoterol + Beclometason
Onbrez	Indacaterol
Oxis	Formoterol
Relvar Ellipta	Fluticasonfuroaat/vilanterol
Seretide	Salmeterol + Fluticason
Serevent	Salmeterol
Symbicort	Formoterol + Budesonide
Singulair	Montelukast
Semprex	Acrivastine
Striverdi	Olodaterol
Theolair Retard	Theofylline
Unilair	Theofylline

168 uur (één week) van te voren staken:

Merknaam	Generieke naam
Anoro	Umeclidinium/vilanterol
Incruse Ellipta	Umeclidinium
Seebri	Glycopyrronium
Spiriva	Tiotropium
Spiolto	Tiotropium/Olodaterol
Tiotrus Zonda	Tiotropium
Xoterna	Indacaterol/glycopyrronium
Ultibro	Indacaterol/glycopyrronium
Trimbrow	beclometasondipropionaat/ formoterolfuma raatdihydraat/ glycopyrronium
Trelegy	Fluticason/vilanterol/umeclidinium

Het is niet nodig om te stoppen met:

merknaam	Generieke naam
Qvar	Beclometason
Flixotide	Fluticasonpropionaat
Pulmicort	Budesonide
Alvesco	Ciclesonide

Hoe gaat de bronchiale provocatietest in zijn werk?

Een longfunctieanalist voert de provocatietest uit. Het onderzoek is niet pijnlijk, maar kan wel vermoeiend zijn.

Bij de bronchiale provocatietest krijgt u een klemmetje op de neus en een mondstuk in de mond. Het klemmetje zorgt ervoor dat er geen lucht via de neus gaat. Het mondstuk is verbonden met een apparaat dat de metingen verricht. U kunt normaal door het mondstuk ademen.

Tijdens de test gaat u met het mondstuk in de mond diep inademen en krachtig en snel uitademen. Voor optimale resultaten is het belangrijk dat u de aanwijzingen van de analist zo goed mogelijk opvolgt.

We proberen de situatie na te bootsen die u misschien ervaart als u in contact komt met:

- prikkeling door rook;
- mist;
- bak- en braadlucht;
- temperatuurwisselingen;
- parfums;
- oplosmiddelen;
- stoffen waarvoor u allergisch bent.

We vragen u om methacholine of histamine in oplopende doseringen te inhaleren. Na elke inhalatie vraagt de longfunctieanalist u om zo diep mogelijk in te ademen en daarna zo snel en zo krachtig mogelijk weer uit te ademen. Aan de hand van de metingen kan dan worden vastgesteld of uw luchtwegen op de methacholine of histamine reageren. Als dit het geval is, kunt u mogelijk klachten krijgen zoals hoesten, kriebel in de keel of een benauwd gevoel.

Is er sprake van een duidelijke reactie, dan stoppen we met de provocatie. De longfunctieanalist geeft u dan een snelwerkende luchtwegverwijder. De benauwdheid is daarna meestal binnen 5 minuten weer weg.

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Zijn er risico's aan de bronchiale provocatietest verbonden?

Eventuele risico's heeft uw behandelend arts van tevoren met u besproken.

De uitslag

Uw behandelend arts bekijkt uw onderzoeksresultaten na afloop van de provocatietest. Bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek bespreekt de arts de uitslag met u.

Vragen?

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoek. Heeft u hier na het lezen van deze tekst nog vragen over? Aarzel dan niet om deze aan uw longarts of aan de medewerkers van de functieafdeling te stellen. U bereikt zowel de afdeling Longgeneeskunde als de functieafdeling via telefoonnummer 088 - 066 1000.

Vragen en opmerkingen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**Samen.
De beste zorg.
Dichtbij.**

ommelanderziekenhuis.nl

T 088 - 066 1000

OZG (06-21) FUN 541